

[B+]

## Körperpflege Oberkörper [F]

Fähigkeit Aktivitäten im Zusammenhang mit der Körperpflege im Bereich des Oberkörpers auszuführen oder zu Ende zu bringen .

EINSCHLUSS: Waschen, Abtrocknen, Hautpflege, Rasur, Haare kämmen, Mund- und Zahnpflege, Reinigung von Zahnprothese.

### 4: volle Fähigkeit

- kann die Körperpflege im Bereich des Oberkörpers selbstständig durchführen (mit oder ohne Hilfsmittel)

### 3: überwiegend vorhandene Fähigkeit

- kann die meisten Tätigkeiten selbstständig durchführen
- benötigt geringe Unterstützung bei einzelnen Tätigkeiten
- benötigt geringe Motivation/ Anleitung/Beratung
- intermittierende, kurzfristige Anwesenheit einer Pflege(fach)person erforderlich

### 2: gering vorhandene Fähigkeit

- kann einzelne Tätigkeiten selbstständig durchführen
- benötigt umfangreiche Unterstützung bei den meisten Tätigkeiten
- benötigt umfangreiche Motivation/ Anleitung/Beratung
- kontinuierliche Anwesenheit einer Pflege(fach)person erforderlich, z.B. auf Grund von Sicherheitsbedenken

### 1: keine Fähigkeit

- keine Fähigkeit die Körperpflege im Bereich des Oberkörpers durchzuführen

- Avlund, K. & Holstein, B. E. (1998). Functional ability among elderly people in three service settings: the discriminatory power of a new functional ability scale. *Eur J Epidemiol*, 14(8), 783-790.

- Bravell, M. E., Zarit, S. H. & Johansson, B. (2011). Self-reported activities of daily living and performance-based functional ability: a study of congruence among the oldest old. *Eur J Ageing*, 8(3), 199-209. doi: 10.1007/s10433-011-0192-6

- Neo, J., Fettes, L., Gao, W., Higginson, I. J. & Maddocks, M. (2017). Disability in activities of daily living among adults with cancer: A systematic review and meta-analysis. *Cancer Treat Rev*, 61, 94-106. doi: 10.1016/j.ctrv.2017.10.006

- Nielsen, L. M., Kirkegaard, H., Ostergaard, L. G., Bovbjerg, K., Breinholt, K. & Maribo, T. (2016). Comparison of self-reported and performance-based measures of functional ability in elderly patients in an emergency department: implications for selection of clinical outcome measures. *BMC Geriatr*, 16(1), 199. doi: 10.1186/s12877-016-0376-1

- Schultz-Larsen, K., Avlund, K. & Kreiner, S. (1992). Functional ability of community dwelling elderly. Criterion-related validity of a new measure of functional ability. *J Clin Epidemiol*, 45(11), 1315-1326.

Legende:

[B] = epaPSYC-B (Basisassessment Psychiatrie); [B+] = epaPSYC-B+ (erweitertes Basisassessment, z.B. Gerontopsychiatrie);

\*\* = epaPSYC-EM (Emergency - Notfallassessment); [KJP] = epaPSYC-KJP (Kinder- und Jugendpsychiatrie)

Inhalte urheberrechtlich geschützt! Rechteinhaber: ePA-CC GmbH, Wiesbaden ([www.epa-cc.de](http://www.epa-cc.de))